

La droga



La drogadicción

Ya sabemos los modos en que se transmite el VIH, por relaciones sexuales, por contacto con sangre contaminada (jeringuillas, etc.), y de madre portadora a su bebé. Se nos ha dicho que no debe hablarse de grupos de riesgo, sino conductas de riesgo. Son matices, pero quizá pueda haber un intento deliberado de hacernos ver que cualquier forma de vivir es indiferente, es admisible. "vive y deja vivir" rezaba el lema de grupos de jóvenes que tonteaban con la droga, como si acaso, las costumbres de unos, sólo fueran perniciosas para ellos. Todos nos hemos dado cuenta, por ejemplo con la pandemia del sida, que los males pasan después a personas inocentes.

De todos se infiere que las drogas que comparten las drogas de otro tipo de drogas, transmiten el VIH en el primer momento de la enfermedad de inicio en el 1990 del Observatorio Europeo de Drogas y del Tóxico, que España estaba en la línea de la VIH en la época de la epidemia de SIDA por los puntos de venta de drogas, la práctica de inyectarse y el uso de agujas, incrementando contagios de drogas. Esto produce que se disminuya la utilización de inyectores en el 82 por ciento de los toxicómanos de porción intravenosa, esto es, el uso de drogas de inyección (SIDA y Drogas) y por estas diferencias entre las diferentes drogas, de la población de adictos morían entre seis y siete mil personas por abuso de drogas.

En otros casos, el sida se contagia por una mezcla de drogadicción y sexo. Así lo demostraron estudios hechos públicos por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, a comienzos de 1995. Un estudio detectó que de los 40.000 nuevos casos de infección por el virus VIH registrados en 1994 en USA, casi tres cuartas partes de ellos eran toxicómanos. El principal grupo de riesgo no lo constituían sólo los adictos por vía intravenosa; un número creciente estaba formado por adictos al crack, y especialmente mujeres, que se contagiaron al tener relaciones sexuales con otros adictos.

Esos estudios y otros posteriores, dejan ver claramente, que con otras drogas (bajo sus efectos) también se contagia mucho el SIDA, pues se mantienen relaciones sexuales bajo los efectos de drogas o de alcohol. En esas circunstancias es difícil recordar, o hacer caso a recomendaciones de campañas.